CORRECTION (résumé)

Question de théorie

- (i) Quelle est la forme explicite de la dérivée de la fonction $\arcsin$? Démontrer ce résultat.
 (ii) Soit f une fonction de deux variables réelles, définie dans $\mathbb{R}^2$. Quand dit-on que f est dérivable par rapport à sa première variable au point $(1, 2)$? Que vaut alors sa dérivée partielle par rapport à la première variable en ce point?

Solution. Voir cours et notes de cours.

Exercices

1. (a) Résoudre les équations et inéquation suivantes (pour (ii), (iii), on suppose que $x \in [0, 2\pi]$)

$$(i) \quad x|x^2 - 1| \leq |x - 1|, \quad (ii) \quad \sin x \cos x = 1, \quad (iii) \quad 4 \sin x \cos x = 1.$$

- (b) Simplifier au maximum l'expression suivante

$$\sin \left(\arcsin \left(\sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) \right) \right)$$

Solution. (a) (i) L'inéquation est vérifiée pour $x = 1$. Pour $x \neq 1$, puisque $|x^2 - 1| = |x - 1| |x + 1|$ et que $|x - 1| > 0$, elle est équivalente à

$$x|x + 1| \leq 1.$$

On a

$$\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x^2 + x = x|x + 1| \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left[-1, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right]$$

et

$$\begin{cases} x + 1 < 0 \\ -x^2 - x = x|x + 1| \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x < -1.$$

Il s'ensuit que les réels qui vérifient l'inéquation sont ceux de l'ensemble

$$\left] -\infty, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right] \cup \{1\}.$$

- (a) (ii) Comme $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$, l'équation est équivalente à

$$\sin(2x) = 2.$$

L'image de la fonction sinus étant l'intervalle $[-1, 1]$, cette équation n'a pas de solution.

- (a) (iii) Comme $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$, l'équation est équivalente à

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}.$$

Cela étant, comme $\frac{1}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, les réels x de l'intervalle $[0, 2\pi]$ qui vérifient cette équation sont

$$\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}.$$

- (b) On a $\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $-\frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Le fait que les fonctions $\sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, et $\arcsin x$, $x \in [-1, 1]$, soient inverses l'une de l'autre conduit alors à

$$\arcsin \left(\sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) \right) = \arcsin \left(\sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) = -\frac{\pi}{3}$$

donc

$$\sin \left(\arcsin \left(\sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) \right) \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

2. Si elles existent, déterminer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{|1-x|}.$$

Solution. Comme la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x-1}$ est définie sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$, la limite de ses valeurs lorsque x tend vers 1 peut être considérée. Cela étant, on a

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x-1} = D \ln(1) = 1$$

car la fonction logarithme est dérivable sur $]0, +\infty[$. (Note: on peut aussi utiliser le théorème de l'Hospital.)

Comme la fonction $x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{|1-x|}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, ensemble non minoré, on peut envisager la limite de ses valeurs lorsque x tend vers moins l'infini. Cela étant, on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{|1-x|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{\frac{1}{x}+1}}{1-x} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{\frac{1}{x}+1}}{\frac{1}{x}-1} = 1.$$

3. Si elles existent, déterminer la valeur des intégrales suivantes et simplifier votre réponse au maximum

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x \, dx, \quad \int_0^{+\infty} x e^{-x/2} \, dx.$$

Solution. La fonction $x \mapsto \sin x \cos^2 x$ est continue sur $\mathbb{R}$; elle est donc intégrable sur l'intervalle fermé borné $[0, \frac{\pi}{2}]$. Cela étant, on a

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x \, dx = -\frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} D \cos^3 x \, dx = -\frac{1}{3} [\cos^3 x]_0^{\pi/2} = \frac{1}{3}.$$

La fonction $x \mapsto x e^{-x/2}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Pour tout $t > 0$, cette fonction est donc intégrable sur $[0, t]$ et on a (intégration par parties)

$$\begin{aligned} \int_0^t x e^{-x/2} \, dx &= -2 \int_0^t x D e^{-x/2} \, dx \\ &= -2te^{-t/2} + 2 \int_0^t e^{-x/2} \, dx = -2te^{-t/2} - 4(e^{-t/2} - 1) \\ &= 4 - 2te^{-t/2} - 4e^{-t/2} \end{aligned}$$

donc

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t x e^{-x/2} \, dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} (4 - 2te^{-t/2} - 4e^{-t/2}) = 4.$$

Comme la fonction $x e^{-x/2}$ ($x \geq 0$), est à valeurs positives, la limite précédente donne son intégrabilité et la valeur de son intégrale sur $[0, +\infty[$

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x/2} \, dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t x e^{-x/2} \, dx = 4.$$

4. On donne la fonction f de manière explicite par

$$f(x, y) = \sqrt{y^2 + 4x^2 - 1}.$$

- (i) Quel est le domaine de dérivabilité de f ? Représenter celui-ci dans un repère orthonormé en le hachurant.
- (ii) Si c'est possible, déterminer la valeur des dérivées partielles $(D_x f)(1, 0)$ et $(D_x f)(0, 1)$. Dans le cas où ce n'est pas possible, en donner la raison.
- (iii) On définit F par $F(t) = f\left(\frac{e^t}{2\sqrt{2}}, \frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)$. Où cette fonction est-elle dérivable? Déterminer sa forme explicite, ainsi que celle de sa dérivée.

Solution. (i) Comme la fonction racine carrée est dérivable sur $]0, +\infty[$, la fonction f est dérivable sur

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 + 4x^2 - 1 > 0\}.$$

Une représentation graphique de cet ensemble est la suivante: il s'agit de l'“extérieur” de l'ellipse d'équation cartésienne $4x^2 + y^2 = 1$; les points de cette courbe ne sont pas compris dans l'ensemble hachuré.

- (ii) Le point de coordonnées cartésiennes $(1, 0)$ appartient au domaine de dérivabilité de f et on a

$$D_x f(x, y) = \frac{4x}{\sqrt{y^2 + 4x^2 - 1}}, \quad (D_x f)(1, 0) = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}.$$

On ne peut déterminer la valeur de l'autre dérivée partielle car le point de coordonnées cartésiennes $(0, 1)$ ne fait pas partie du domaine de dérivabilité.

- (iii) On a

$$F(t) = \sqrt{\frac{e^{2t}}{2} + \frac{e^{2t}}{2} - 1} = \sqrt{e^{2t} - 1}.$$

Cette fonction F est donc dérivable sur $\{t \in \mathbb{R} : e^{2t} - 1 > 0\} =]0, +\infty[$ et dans cet ensemble, on a

$$DF(t) = \frac{e^{2t}}{\sqrt{e^{2t} - 1}}.$$

5. (i) Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-e^{-x}}$ vérifie l'équation différentielle

$$e^x Df(x) - f(x) = 0.$$

(ii) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle

$$9D^2f(x) + 6Df(x) + f(x) = 1$$

Solution. (i) La fonction donnée est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a $De^{-e^{-x}} = e^{-e^{-x}} e^{-x}$ pour tout x donc

$$e^x De^{-e^{-x}} - e^{-e^{-x}} = 0.$$

(ii) L'équation donnée est une équation différentielle linéaire à coefficients constants d'ordre 2 non homogène.

L'équation homogène associée est $9D^2f(x) + 6Df(x) + f(x) = 0$; le polynôme caractéristique est $z \mapsto 9z^2 + 6z + 1 = (3z + 1)^2$ et son seul zéro est $-\frac{1}{3}$. Il s'ensuit que les solutions de l'équation homogène sont les fonctions

$$(c_1x + c_2)e^{-x/3}, \quad x \in \mathbb{R}$$

où c_1, c_2 sont des constantes arbitraires.

On voit immédiatement qu'une solution particulière est la fonction constante 1.

Finalement, les solutions de l'équation donnée sont les fonctions

$$1 + (c_1x + c_2)e^{-x/3}, \quad x \in \mathbb{R}$$

où c_1, c_2 sont des constantes arbitraires.

6. Les courbes de croissance de population du modèle de Gompertz sont les représentations de fonctions exponentielles du type

$$f(t) = e^{be^{ct}}, \quad t \in \mathbb{R}$$

où b, c sont des paramètres réels strictement négatifs.

(i) Déterminer la dérivée seconde de f .

(ii) Quelle(s) valeur(s) doit-on donner à b pour que la dérivée seconde de f s'annule en $t = 0$?

(iii) Pour $b = c = -2$, déterminer la limite des valeurs de f aux extrémités de son domaine de définition.

Solution. Quels que soient les paramètres b, c la fonction donnée est indéfiniment continûment dérivable sur $\mathbb{R}$.

(i) On a successivement

$$Df(t) = e^{be^{ct}} bce^{ct} = bc e^{ct} f(t), \quad D^2f(t) = bc (ce^{ct} f(t) + e^{ct} Df(t)) = bc^2 e^{ct} f(t) (1 + be^{ct}).$$

(ii) Comme la fonction exponentielle ne s'annule jamais, on a

$$D^2f(0) = 0 \Leftrightarrow 1 + b = 0 \Leftrightarrow b = -1.$$

(iii) Pour $b = c = -2$ on a

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{-2e^{-2t}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-2y} = 0$$

et

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2e^{-2t}} = \lim_{y \rightarrow 0} e^{-2y} = 1.$$

Problème élémentaire

Lors d'une interrogation, un étudiant doit répondre à 100 questions d'un QCM. Pour toute réponse correcte, il obtient 1 point et pour toute réponse incorrecte, on lui retire 0,25 point. Sachant qu'il obtient 53,75 comme cote finale et qu'il est obligé de répondre à toutes les questions, quel est le nombre de réponses correctes fournies?

Solution. Soit x le nombre de réponses correctes fournies. On a

$$x - \frac{1}{4}(100 - x) = 53 + \frac{3}{4}$$

ce qui est équivalent à

$$\frac{5}{4}x = 53 + \frac{3}{4} + 25 = 78 + \frac{3}{4} = \frac{4 \times 78 + 3}{4} = \frac{315}{4}.$$

On obtient ainsi que le nombre de réponses correctes est

$$x = \frac{315}{5} = 63.$$

QCM

1. Parmi les graphiques ci-dessous, lequel est celui de la fonction $f(x) = e^{-\frac{x}{2}}$, $x \in \mathbb{R}$?

(1)

(2)

(3)

(4)

- 1) ♣ graphique 1
- 2) graphique 2
- 3) graphique 3
- 4) graphique 4

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x|x| - 1$ est

- 1) paire
- 2) impaire
- 3) ♣ croissante
- 4) décroissante
- 5) aucune des réponses précédentes n'est correcte

3. Si on double la longueur de l'arête d'un cube, l'aire totale des faces de ce cube est

- 1) multipliée par 2
- 2) ♣ multipliée par 4
- 3) multipliée par 6
- 4) multipliée par 8
- 5) aucune des réponses précédentes n'est correcte

Problème élémentaire

Lors d'une interrogation, un étudiant doit répondre à 100 questions d'un QCM. Pour toute réponse correcte, il obtient 1 point et pour toute réponse incorrecte, on lui retire 0,25 point. Sachant qu'il obtient 62,5 comme cote finale et qu'il est obligé de répondre à toutes les questions, quel est le nombre de réponses correctes fournies?

Solution. Soit x le nombre de réponses correctes fournies. On a

$$x - \frac{1}{4}(100 - x) = 62 + \frac{1}{2}$$

ce qui est équivalent à

$$\frac{5}{4}x = \frac{125}{2} + 25 = \frac{175}{2}.$$

On obtient ainsi que le nombre de réponses correctes est

$$x = \frac{175 \times 2}{5} = 70.$$

QCM

1. Parmi les graphiques ci-dessous, lequel est celui de la fonction $f(x) = e^{-2e^{-2x}}$, $x \in \mathbb{R}$?

(1)

(2)

(3)

(4)

- 1) graphique 1
- 2) graphique 2
- 3) ♣ graphique 3
- 4) graphique 4

2. La fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = |\ln x|$ est

- 1) paire
- 2) impaire
- 3) croissante
- 4) décroissante
- 5) ♣ aucune des réponses précédentes n'est correcte

3. Si on double la longueur de l'arête d'un cube, alors le rapport de l'aire totale des faces du cube vis-à-vis de son volume est

- 1) multiplié par 2
- 2) multiplié par 3
- 3) ♣ divisé par 2
- 4) divisé par 3
- 5) aucune des réponses précédentes n'est correcte