

---

Université  
de Liège



# *1, 2, 3...Sciences*

*Année académique 2009-2010*

---

EXERCICES DE MATHÉMATIQUE  
LISTE TYPE NUMÉRO 11  
RÉPÉTITIONS 14 ET 15 (SEMAINES 13 ET 14)

---

## *Exercices récapitulatifs.*

---

### Exercices à résoudre

1. (a) Résoudre les équations et inéquation suivantes (pour (ii), (iii), on suppose que  $x \in [0, 2\pi]$ )

$$(i) x|x^2 - 1| \leq |x - 1|, \quad (ii) \sin x \cos x = 1, \quad (iii) 4 \sin x \cos x = 1.$$

- (b) Simplifier au maximum l'expression suivante :  $\sin\left(\ln e^{\pi/3}\right) + \cos(\operatorname{tg}(5\pi/4))$

2. Si elles existent, déterminer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|1 - x|}.$$

3. Si elles existent, déterminer la valeur des intégrales suivantes et simplifier votre réponse au maximum

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x \, dx, \quad \int_0^{+\infty} x e^{-x/2} \, dx.$$

4. Représenter l'ensemble dont une description analytique est la suivante

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y^2 \leq 1 - 4x^2 \right\}$$

5. (i) Montrer que la fonction  $x \mapsto e^{-e^{-x}}$  vérifie l'équation différentielle

$$e^x Df(x) - f(x) = 0.$$

- (ii) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle

$$9D^2f(x) + 6Df(x) + f(x) = 1$$

6. Les courbes de croissance de population du modèle de Gompertz sont les représentations de fonctions exponentielles du type

$$f(t) = e^{be^{ct}}, \quad t \in \mathbb{R}$$

où  $b, c$  sont des paramètres réels strictement négatifs.

- (i) Déterminer la dérivée seconde de  $f$ .

- (ii) Quelle(s) valeur(s) doit-on donner à  $b$  pour que la dérivée seconde de  $f$  s'annule en  $t = 0$  ?

- (iii) Pour  $b = c = -2$ , déterminer la limite des valeurs de  $f$  aux extrémités de son domaine de définition.

### Problème élémentaire

Lors d'une interrogation, un étudiant doit répondre à 100 questions d'un QCM. Pour toute réponse correcte, il obtient 1 point et pour toute réponse incorrecte, on lui retire 0,25 point. Sachant qu'il obtient 53,75 comme cote finale et qu'il est obligé de répondre à toutes les questions, quel est le nombre de réponses correctes fournies ?

### QCM

1. La fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x|x| - 1$  est

- 1) paire
- 2) impaire
- 3) croissante
- 4) décroissante
- 5) aucune des réponses précédentes n'est correcte

2. Si on double la longueur de l'arête d'un cube, l'aire totale des faces de ce cube est

- 1) multipliée par 2
- 2) multipliée par 4
- 3) multipliée par 6
- 4) multipliée par 8
- 5) aucune des réponses précédentes n'est correcte