

---

Université  
de Liège



# *1, 2, 3... Sciences*

*Année académique 2014-2015*

---

QUESTIONNAIRE ET CORRIGÉ  
EXAMEN DE MATH B DU 1ER JUIN 2015  
GÉOLOGUES

---

---



---

QUESTIONNAIRE

---



---

1. On donne la fonction  $f$  par  $f(x) = \cos^2(x)$ .

- a) Si possible, déterminer les approximations polynomiales de cette fonction à l'ordre 1 et 2 en 0.
- b) Dans un même repère orthonormé, représenter au voisinage de 0 le graphique de  $f$  et des approximations demandées en utilisant différentes couleurs.

2. Soient les matrices  $A$ ,  $B$  et  $X$  données par

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$


- Si c'est possible, déterminer la matrice inverse de  $B$ .
- La matrice  $B$  est-elle diagonalisable? Pourquoi? Si oui, en déterminer une forme diagonale, ainsi qu'une matrice qui y conduit.
- Quelle est la forme générale des matrices qui commutent avec  $B$ ? Justifier.
- Montrer **directement** que  $X$  est un vecteur propre de  $A$  de valeur propre  $\lambda_0$  et donner la valeur de  $\lambda_0$ .

3. a) On donne la fonction  $f$  par

$$f(x, y) = \ln(y^2 - x).$$

- Déterminer le domaine d'infinie dérivabilité de cette fonction. Dans un repère orthonormé, représenter ce domaine en le hachurant.
- Déterminer l'expression explicite de  $F(t) = f(1, e^t - 1)$ , le domaine de dérivabilité de cette fonction et l'expression explicite de sa dérivée en tout point de son domaine.
- Si elle existe, que vaut la dérivée de  $F$  en  $t = 0$ ? Simplifier votre réponse au maximum.

b) On donne l'ensemble fermé borné hachuré  $A$  suivant. Déterminer  $\iint_A y e^x dx dy$ .




c) Soit  $f$  une fonction intégrable sur la partie  $A$  du plan telle que

$$\iint_A f(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 \left( \int_{\frac{1}{y}}^y f(x, y) dx \right) dy.$$

- Représenter l'ensemble d'intégration  $A$  dans un repère orthonormé en le hachurant.
- Permuter l'ordre d'intégration.
- Trouve-t-on la même valeur quel que soit l'ordre d'intégration? Pourquoi?

4. On donne l'ensemble hachuré  $A$  ci-contre.  
Si elle existe, déterminer la valeur de l'intégrale

$$\iint_A \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)} dx dy.$$



5. Déterminer si les séries suivantes convergent. Si oui, en déterminer la somme

$$(i) \sum_{m=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{-\sqrt[3]{e}} \right)^m,$$

$$(ii) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{e^k}{k^2},$$

$$(iii) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\tan(\frac{\pi}{6}))^n}{n!}.$$

---

---

CORRIGÉ

---

---

**Exercices**


1. On donne la fonction  $f$  par  $f(x) = \cos^2(x)$ .
- a) Si possible, déterminer les approximations polynomiales de cette fonction à l'ordre 1 et 2 en 0.
- b) Dans un même repère orthonormé, représenter au voisinage de 0 le graphique de  $f$  et des approximations demandées en utilisant différentes couleurs. .

*Solution.* La fonction est infiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$  et on a

$$Df(x) = 2 \cos(x)(-\sin(x)) = -\sin(2x), \quad D^2f(x) = -2 \cos(2x).$$

Comme  $f(0) = 1$ ,  $Df(0) = 0$  et  $D^2f(0) = -2$ , si on note  $P_n(x)$  l'approximation polynomiale de  $f$  à l'ordre  $n$  en 0, on a

$$P_1(x) = f(0) + Df(0)x = 1, \quad P_2(x) = P_1(x) + \frac{D^2f(0)}{2!}x^2 = 1 - x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$



2. Soient les matrices  $A$ ,  $B$  et  $X$  données par

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Si c'est possible, déterminer la matrice inverse de  $B$ .

*Solution.* La matrice  $B$  est inversible si et seulement si  $\det B \neq 0$ . Comme  $\det B = -4$ , la matrice  $B$  est donc inversible.

La matrice des cofacteurs de  $B$  étant égale à

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

l'inverse de  $B$  est la matrice

$$B^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- La matrice  $B$  est-elle diagonalisable? Pourquoi? Si oui, en déterminer une forme diagonale, ainsi qu'une matrice qui y conduit.

*Solution.* Les valeurs propres de  $B$  sont les zéros du polynôme  $\begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$ . La matrice  $B$  possède donc deux valeurs propres simples,  $-2$  et  $2$ ; elle est donc diagonalisable.

Les vecteurs propres relatifs à la valeur propre  $-2$  sont les vecteurs non nuls  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  tels que

$$(B + 2I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs propres associés à la valeur propre  $-2$  sont donc des vecteurs du type

$$c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

où  $c$  est une constante complexe non nulle.

Les vecteurs propres relatifs à la valeur propre  $2$  sont les vecteurs non nuls  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  tels que

$$(B - 2I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs propres associés à la valeur propre  $2$  sont donc des vecteurs du type

$$c' \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

où  $c'$  est une constante complexe non nulle.

Dès lors, la matrice inversible  $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  est telle que  $S^{-1}BS = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

- Quelle est la forme générale des matrices qui commutent avec  $B$ ? Justifier.

*Solution.* Comme  $B$  est une matrice de dimension 2, toute matrice qui commute avec  $B$  est aussi de dimension 2.

Soit  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  avec  $a, b, c$  et  $d \in \mathbb{C}$ . On a

$$BM = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c & 2d \\ 2a & 2b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad MB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b & 2a \\ 2d & 2c \end{pmatrix}.$$

Dès lors,  $BM = MB \Leftrightarrow b = c$  et  $a = d$  et on a  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$  avec  $a$  et  $b \in \mathbb{C}$ .

- Montrer directement que  $X$  est un vecteur propre de  $A$  de valeur propre  $\lambda_0$  et donner la valeur de  $\lambda_0$ .

*Solution.* Par définition,  $X$  est un vecteur propre de  $A$  de valeur propre  $\lambda_0$  si  $AX = \lambda_0 X$ . Comme

$$AX = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-2) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$X$  est bien un vecteur propre de  $A$  de valeur propre  $-2$ .

3. a) On donne la fonction  $f$  par


$$f(x, y) = \ln(y^2 - x).$$

- Déterminer le domaine d'infinie dérivabilité de cette fonction. Dans un repère ortho-normé, représenter ce domaine en le hachurant.

*Solution.* Le domaine d'infinie dérivabilité de la fonction  $f$  est égal à

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x > 0\}.$$

Voici la représentation graphique de cet ensemble (partie hachurée) : les points de la parabole d'équation cartésienne  $y^2 - x = 0$  sont exclus de l'ensemble.



- Déterminer l'expression explicite de  $F(t) = f(1, e^t - 1)$ , le domaine de dérivabilité de cette fonction et l'expression explicite de sa dérivée en tout point de son domaine.

*Solution.* L'expression explicite de  $F(t)$  est donnée par

$$F(t) = \ln((e^t - 1)^2 - 1) = \ln(e^{2t} - 2e^t) = \ln(e^t(e^t - 2)) = t + \ln(e^t - 2).$$


La fonction  $F$  est dérivable sur  $\{t \in \mathbb{R} : e^t - 2 > 0\} = \{t \in \mathbb{R} : t > \ln(2)\} = ]\ln(2), +\infty[$  et sa dérivée en tout point de cet ensemble est donnée par

$$DF(t) = 1 + \frac{e^t}{e^t - 2} = \frac{2(e^t - 1)}{e^t - 2}.$$

- Si elle existe, que vaut la dérivée de  $F$  en  $t = 0$ ? Simplifier votre réponse au maximum.

*Solution.* Comme  $F$  est dérivable sur  $]\ln(2), +\infty[$  et que  $\ln(x) > 0$  si  $x > 1$ , la fonction  $F$  n'est pas dérivable en 0.

b) On donne l'ensemble fermé borné hachuré  $A$  suivant. Déterminer  $\iint_A y e^x dx dy$ .



*Solution.* La fonction  $f : (x, y) \mapsto y e^x$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$  donc sur  $A$ , ensemble borné fermé. Dès lors, la fonction est intégrable sur  $A$ .

Utilisons les coordonnées polaires pour calculer l'intégrale demandée. Le point d'intersection du cercle trigonométrique avec la droite d'équation cartésienne  $x = \frac{1}{2}$  a pour abscisse  $\cos(\theta) = \frac{1}{2}$  où  $\theta = \frac{\pi}{3}$  puisque  $\theta$  varie dans  $[0, 2\pi[$ . De même, le point d'intersection du cercle avec la droite d'équation cartésienne  $x = -\frac{1}{2}$  a pour abscisse  $\cos(\theta) = -\frac{1}{2}$  où  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  puisque  $\theta$  varie dans  $[0, 2\pi[$ . Ainsi, l'ensemble d'intégration décrit en coordonnées polaires est

$$B = \left\{ (r, \theta) : r \in ]0, 1], \theta \in \left[ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right] \right\}.$$

La fonction à intégrer est la fonction  $g : (r, \theta) \mapsto f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = r \sin(\theta) e^{r \cos(\theta)}$  multipliée par le jacobien égal à  $r$ . Par application du théorème d'intégration par changement de variables, l'intégrale demandée est donc égale à


$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} r^2 \sin(\theta) e^{r \cos(\theta)} d\theta \right) dr &= \int_0^1 -r \left[ e^{r \cos(\theta)} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} dr = \int_0^1 r \left( e^{\frac{r}{2}} - e^{-\frac{r}{2}} \right) dr \\ &= \left[ 2r \left( e^{\frac{r}{2}} + e^{-\frac{r}{2}} \right) \right]_0^1 - 2 \int_0^1 \left( e^{\frac{r}{2}} + e^{-\frac{r}{2}} \right) dr = 2 \left( e^{\frac{1}{2}} + e^{-\frac{1}{2}} \right) - 4 \left[ e^{\frac{r}{2}} - e^{-\frac{r}{2}} \right]_0^1 \\ &= 2 \left( e^{\frac{1}{2}} + e^{-\frac{1}{2}} \right) - 4 \left( e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}} \right) = -2\sqrt{e} + \frac{6}{\sqrt{e}}. \end{aligned}$$

c) Soit  $f$  une fonction intégrable sur la partie  $A$  du plan telle que

$$\iint_A f(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 \left( \int_{\frac{1}{y}}^y f(x, y) dx \right) dy.$$

- Représenter l'ensemble d'intégration  $A$  dans un repère orthonormé en le hachurant.

*Solution.* L'ensemble d'intégration est l'ensemble  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [-1, 0[, x \in [\frac{1}{y}, y]\}$ ; en voici la représentation graphique (partie hachurée); les points des "bords" sont compris dans l'ensemble excepté ceux de l'axe des abscisses.



- Permuter l'ordre d'intégration.

*Solution.* Comme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in ]-\infty, -1], y \in [1/x, 0[\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1, 0], y \in [x, 0[\}$$

si on permute l'ordre d'intégration, on a la succession d'intégrales


$$\int_{-\infty}^{-1} \left( \int_{1/x}^0 f(x, y) dy \right) dx + \int_{-1}^0 \left( \int_x^0 f(x, y) dy \right) dx.$$

**- Trouve-t-on la même valeur quel que soit l'ordre d'intégration ? Pourquoi ?**

*Solution.* On trouve la même valeur pour l'intégrale quel que soit l'ordre d'intégration car la fonction est intégrable.

4. On donne l'ensemble hachuré  $A$  ci-contre. Si elle existe, déterminer la valeur de l'intégrale

$$\iint_A \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)} dx dy.$$



*Solution.* La fonction  $f : (x, y) \mapsto \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)}$  est continue sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ; elle est donc continue sur  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1, +\infty[, y \in [\frac{x^2}{2}, x^2]\}$ , ensemble fermé non borné.

Etudions l'intégrabilité de  $f$  sur  $A$  sachant que  $|f(x, y)| = f(x, y) \forall (x, y) \in A$ .

Pour  $x$  fixé dans  $[1, +\infty[$ , la fonction  $g : y \mapsto \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)}$  est continue sur le fermé borné  $[\frac{x^2}{2}, x^2]$ . Elle est donc intégrable sur cet ensemble et on a

$$\int_{x^2/2}^{x^2} \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)} dy = \frac{1}{2x^2} \cdot \left[ \ln(y^2 + x^4) \right]_{x^2/2}^{x^2} = \frac{1}{2x^2} \left( \ln(2x^4) - \ln\left(\frac{5x^4}{4}\right) \right) = \frac{1}{2x^2} \ln\left(\frac{8}{5}\right).$$

La fonction  $h : x \mapsto \ln\left(\frac{8}{5}\right) \frac{1}{2x^2}$  est continue et positive sur  $\mathbb{R}_0$  donc sur  $[1, +\infty[$  non borné. Etudions son intégrabilité en  $+\infty$ . Comme  $h$  est continu sur  $[1, t] \forall t > 1$ , on a

$$\int_1^t \ln\left(\frac{8}{5}\right) \frac{1}{2x^2} dx = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{5}\right) \left[ \frac{1}{x} \right]_1^t = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{t}\right).$$

Dès lors, comme  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$ , on a

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \ln\left(\frac{8}{5}\right) \frac{1}{2x^2} dx = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{5}\right).$$

Vu que cette limite est finie,  $h$  est intégrable en  $+\infty$  donc sur  $[1, +\infty[$ .

Ainsi,  $f$  est intégrable sur  $A$  et comme cette fonction est positive sur  $A$ , on obtient

$$\iint_A \frac{y}{x^2(y^2 + x^4)} dx dy = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{5}\right).$$

5. Déterminer si les séries suivantes convergent. Si oui, en déterminer la somme

$$(i) \sum_{m=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{-\sqrt[3]{e}} \right)^m, \quad (ii) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{e^k}{k^2}, \quad (iii) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\tan(\frac{\pi}{6}))^n}{n!}.$$

*Solution.* (i) Cette série est une série géométrique de raison  $\frac{1}{-\sqrt[3]{e}} \in ]-1, 1[$  donc convergente ; sa somme vaut

$$\frac{1}{-\sqrt[3]{e}} \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{-\sqrt[3]{e}}\right)} = -\frac{1}{\sqrt[3]{e} + 1}.$$

(ii) Comme le terme général de cette série ne tend pas vers 0 puisque  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{e^k}{k^2} = +\infty$ , l'exponentielle dominant toute puissance antagoniste à l'infini, la série est divergente.

(iii) Cette série est convergente car c'est la valeur de la fonction exponentielle en  $\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

La somme de cette série vaut donc  $\exp\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ .