



Listes d'EXERCICES

relatifs au cours

Introduction à l'analyse harmonique

Math 0511, 3BM

0 (Rappels). Intégrales eulériennes

— Exercices de base —

Exercice 1. Calculer si possible les limites

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(m!)^{\frac{1}{m}}}{m} \quad \text{et} \quad \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(m!)}{m} - \ln(m) \right).$$

Exercice 2. Exprimer $\Gamma(5/6)$ en fonction de $\Gamma(1/6)$.

Exercice 3. Etablir que pour tous $m > 0, n > -1, a > 0$, on a

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^m} x^n dx = \frac{1}{m} \Gamma\left(\frac{n+1}{m}\right) a^{-\frac{n+1}{m}}.$$

Exercice 4. Pour tout $x > 1$, on pose

$$\zeta(x) = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^x}.$$

Montrer que, pour tout $x > 1$, on a

$$\zeta(x)\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{e^t - 1} dt.$$

Exercice 5. Montrer que la mesure d'une boule de $\mathbb{R}^n$ de rayon $r > 0$ est donnée par la formule

$$\omega_n(r) = \frac{\pi^{n/2} r^n}{\Gamma(n/2 + 1)}.$$

En déduire que $\omega_n(r) \rightarrow 0$ si $n \rightarrow +\infty$.

— Autres exercices —

Exercice 6. Prouver que la série

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k!)^2 2^k}{(2k+1)!}$$

converge absolument et montrer que sa limite est égale à $\pi/2$.

Exercice 7 (Définition de Gauss de Γ). Démontrer que pour tout $x > 0$, on a

$$\Gamma(x) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^x m!}{x(x+1)\dots(x+m)}.$$

Exercice 8. Prouver que

$$\int_0^1 \ln(\Gamma(x)) \sin(\pi x) dx = \frac{1 + \ln(\pi/2)}{\pi}.$$

1. Espaces L^1 , L^2 , L^∞ .

Exercice 1. Pour tout $m \in \mathbb{N}_0$, on pose

$$f_m(x) = \frac{1}{m} \chi_{[-m, m]}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Pour tout $m \in \mathbb{N}_0$, déterminer si la fonction f_m est continue, intégrable, de carré intégrable, bornée et en calculer les normes correspondantes.
- (b) Etudier la convergence ponctuelle et la convergence uniforme de la suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ sur $\mathbb{R}$.
- (c) Etudier la convergence de la suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ pour chacune des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 2. Pour tout $m \in \mathbb{N}_0$, on pose

$$f_m(x) = m^{3/2} x e^{-mx}, \quad x \in [0, +\infty[.$$

- (a) Pour tout $m \in \mathbb{N}_0$, déterminer si la fonction f_m est continue, intégrable, de carré intégrable, bornée et en calculer les normes correspondantes.
- (b) Etudier la convergence ponctuelle et la convergence uniforme de la suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ sur $[0, +\infty[$.
- (c) Etudier la convergence de la suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ pour chacune des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 3. On donne la suite de fonctions f_m suivante

$$f_m(x) = \frac{\sqrt{m}}{1 + m^2 x^2}, \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

- (a) Déterminer l'ensemble A sur lequel cette suite converge ponctuellement, ainsi que sa limite.
- (b) Etudier la convergence uniforme de cette suite sur A et sur les ensembles bornés fermés inclus dans A .
- (c) Etudier la convergence de la suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}_0}$ pour chacune des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 4. Soit E une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$.

- (a) Si $f_m \rightarrow f$ pour $\|\cdot\|_1$ et $g_m \rightarrow g$ pour $\|\cdot\|_\infty$, montrer que $f_m g_m \rightarrow f g$ pour $\|\cdot\|_1$.
- (b) Si $f_m \rightarrow f$ pour $\|\cdot\|_2$ et $g_m \rightarrow g$ pour $\|\cdot\|_2$, montrer que $f_m g_m \rightarrow f g$ pour $\|\cdot\|_1$.

Exercice 5. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Si $f \in C_0([a, b]) \cap C_1(]a, b[)$ et si Df est continue et de carré intégrable sur $]a, b[$, démontrer que

$$|f(b) - f(a)|^2 \leq (b - a) \|Df\|_2^2.$$

Exercice 6. Pour tout $n \in \mathbb{N}_0$, on pose

$$\delta_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2 x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Examiner la convergence ponctuelle et uniforme sur $\mathbb{R}$ de la suite $(\delta_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.
- (b) Les fonctions δ_n sont-elles continues, intégrables, de carré intégrable, bornées sur $\mathbb{R}$? Si c'est le cas, examiner la convergence de la suite pour les normes correspondantes.

(c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}_0$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} \delta_n(x) dx = 1.$$

(d) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} \delta_n(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$$

pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (i.e. pour tout $\varphi \in C_\infty(\mathbb{R})$ à support compact dans $\mathbb{R}$).

Exercice 7. Soient $r > 0$ et f une fonction continue et de carré intégrable sur $]0, r[$. Démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

Si f est continue et de carré intégrable sur $]0, +\infty[$, démontrer alors que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

2. Produit de convolution

Exercice 1. Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} x/2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

- (a) Calculer si possible le produit de convolution de f et g .
(b) Représenter le graphique des fonctions f , g et $f \star g$.

Exercice 2. (a) Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^x \chi_{[1, +\infty[}(x) \quad \text{et} \quad g(x) = x \chi_{[-1, +\infty[}(x).$$

Montrer que le produit de convolution $f \star g$ est défini sur $\mathbb{R}$ et donner sa valeur en tout point de $\mathbb{R}$.

- (b) Même question si

$$f(x) = \cos(x) \chi_{[0, +\infty[}(x) \quad \text{et} \quad g(x) = \sin(x) \chi_{[0, +\infty[}(x).$$

- (c) Même question si

$$f(x) = e^{-|x|} \quad \text{et} \quad g(x) = e^{-|x|}.$$

Exercice 3. Pour tout $t > 0$ on définit la fonction q_t par

$$q_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Montrer que

$$q_t \star q_s = q_{t+s}, \quad \forall t, s > 0.$$

Exercice 4. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < b$. Si on pose

$$f(x) = e^{-ax} \chi_{[0, +\infty[}(x) \quad \text{et} \quad g(x) = e^{-bx} \chi_{[0, +\infty[}(x),$$

montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{(f \star g)(x)}{x} dx = \frac{\ln(b/a)}{b-a}.$$

Exercice 5. Calculer si possible $\chi_A \star \chi_B$ lorsque

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \quad \text{et} \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1\}.$$

Exercice 6. Soit g_n la fonction caractéristique de l'intervalle $[-n, n]$.

- (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}_0$, calculer $g_n \star g_1$.
(b) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g_n \star g_1\|_1 = +\infty.$$

Exercice 7. Pour $k \in \mathbb{N}_0$, on pose

$$e_k(x) = \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \chi_{]0, +\infty[}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Montrer que

$$D^n(e_m \star \varphi) = e_{m-n} \star \varphi \quad \text{et} \quad D^k(e_k \star \varphi) = \varphi$$

pour tous $n, m, k \in \mathbb{N}_0$ tels que $m > n$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Exercice 8. Soit $f \in L^2([0, +\infty[)$. Posons

$$h(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t} f(t) dt, \quad x \geq 0.$$

Montrer que la fonction h est définie et continue sur $[0, +\infty[$ et que l'on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x h(x) = 0.$$

Exercice 9. Soit $a \in]0, +\infty[$ et H_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$H_a(x) = \frac{1}{a} \chi_{]0, a[}.$$

Soit $a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots$ une suite de nombres strictement positifs tel que $a = \sum_{m=0}^{+\infty} a_m$ converge. Posons pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$u_k = H_{a_0} \star \dots \star H_{a_k}.$$

Il est demandé de prouver que

- (a) Pour tout $k \geq 1$, $u_k \in C^{k-1}(\mathbb{R})$.
- (b) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\text{supp}(u_k) \subset [0, a]$.
- (c) La suite u_k converge vers une fonction $u \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que $\text{supp}(u) \subset [0, a]$ et telle que $\int_{\mathbb{R}} u(x) dx = 1$.
- (d) On a les inégalités

$$\sup_{x \in [0, a]} |(D^k u)(x)| \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |(D^{k+1} u)(x)| dx \leq \frac{2^k}{a_0 \dots a_k},$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 10 (Critère d'annulation pp). Soit Ω un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$ et soit $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Montrer que $f = 0$ pp dans Ω si et seulement si

$$\int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx = 0$$

pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Exercice 11. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires réelles de densités respectives f et g , alors $X + Y$ est une variable aléatoire réelle de densité $f \star g$.

3. Transformation de Fourier dans L^1 – Exercices de base

Exercice 1. Soit $a > 0$. Calculer (si possible) la transformée de Fourier des fonctions suivantes :

- (1) $f_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ix} e^{-x} \chi_{[0, +\infty[}(x)$
- (2) $f_2 : x \in \mathbb{R} \mapsto x e^{-x^2}$
- (3) $f_3 : x \in \mathbb{R} \mapsto (1 - a|x|) \chi_{[-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}]}(x)$
- (4) $f_4 : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{-|x-1|}$
- (5) $f_5 : x \in \mathbb{R} \mapsto \sin(2x) \chi_{[-1, 1]}(x)$.

Exercice 2. Montrer que la transformée de Fourier d'une fonction paire (resp. impaire) est paire (resp. impaire). Qu'en est-il de la réciproque ?

Exercice 3. (1) Calculer (si possible) la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto e^{-\lambda|x|}$ ($x \in \mathbb{R}$) où λ est une constante strictement positive.

(2) Pour tout $\lambda > 0$, on pose

$$R_\lambda(x) = \frac{\lambda}{\pi(x^2 + \lambda^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Montrer que, pour tous $a, b > 0$, on a $R_a \star R_b = R_{a+b}$.

(3) Montrer de deux façons différentes (la première de manière directe, la deuxième en utilisant les points (1) et (2)) que, pour tous $a, b > 0$, on a

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{2ab} \frac{1}{a + b}.$$

Exercice 4. Calculer la transformée de Fourier de la fonction f définie par

$$f(x) = (1 + x) \chi_{[-1, 0]}(x) + (1 - x) \chi_{[0, 1]}(x).$$

En déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^4} dx.$$

Exercice 5. Soient $a, b > 0$. Si possible, calculer

(1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax) \sin(bx)}{x^2} dx$$

(2)

$$\int_0^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin(ax) \cos(bx)}{x} dx$$

(3)

$$\int_0^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin(ax) \sin(bx)}{x} dx, \quad a \neq b.$$

(Rappel : Pour tout $\lambda > 0$, on a $\int_0^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin(\lambda x)}{x} = \frac{\pi}{2}$.)

Exercice 6. En utilisant le théorème du transfert, calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} \sin(x) dx.$$

Exercice 7. Soit un signal f (on suppose que cette fonction est intégrable et de carré intégrable). On définit l'autocorrélation du signal par

$$E_f(t) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{f(x-t)} dx, \quad t \in \mathbb{R}$$

et la densité spectrale de puissance de ce signal (PSD) par

$$D_f(y) = |\mathcal{F}_y^- f|^2, \quad y \in \mathbb{R}.$$

On pose $f^s(x) = \overline{f(-x)}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

- (1) Montrer que l'autocorrélation s'écrit $E_f = f \star f^s$.
- (2) Montrer que l'autocorrélation d'une fonction à valeurs réelles est une fonction paire.
- (3) Montrer que

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |E_f(t)| = E_f(0).$$

- (4) Montrer que la densité spectrale et l'autocorrélation sont liées par la transformation de Fourier (l'une est la transformée de l'autre).

Exercice 8. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Montrer que quelque soit $t \in \mathbb{R}$ on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-itx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{f(\sqrt{x}) + f(-\sqrt{x})}{\sqrt{x}} e^{-ixt} dx.$$

En déduire que f est impair si et seulement si

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-itx^2} dx = 0$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

4. Transformation de Fourier dans L^1 – Exercices approfondis

Exercice 1. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $x \mapsto x\mathcal{F}_x^- f$ soit intégrable. Montrer qu'il existe une fonction $g \in C_1(\mathbb{R})$ qui est égale presque partout à f .

Exercice 2. (1) Montrer qu'il n'existe pas de fonction $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ telle que

$$f \star g = f, \quad \forall f \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

(2) Résoudre l'équation $f \star f = f$ dans $L^1(\mathbb{R}^n)$.

Exercice 3. Rappelons qu'un fermé $F \subset \mathbb{R}^n$ est *régulier* si $F = F^{\circ-}$. Montrer que la régularité est une condition nécessaire et suffisante pour que F soit le support de la transformée de Fourier d'une fonction intégrable sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 4. On sait que la transformation de Fourier est une application linéaire injective de $L^1(\mathbb{R})$ dans l'ensemble des fonctions continues de limite nulle à l'infini $C_0^0(\mathbb{R})$. Le but de cet exercice est de prouver qu'ainsi définie, la transformée de Fourier n'est pas surjective, c'est-à-dire qu'il existe des fonctions de $C_0^0(\mathbb{R})$ qui ne sont pas la transformée de Fourier d'une fonction de $L^1(\mathbb{R})$. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ une fonction impaire.

(1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\mathcal{F}_x^- f = -2i \int_0^{+\infty} f(t) \sin(xt) dt.$$

(2) Prouver que la fonction ϕ définie par

$$\phi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} du$$

pour tout $x \in [0, +\infty[$ est continue et bornée.

(3) Montrer que l'on a

$$\int_1^R \frac{\mathcal{F}_t^- f}{t} dt = \int_0^{+\infty} -2i f(x) \left(\int_x^{Rx} \frac{\sin u}{u} du \right) dx.$$

En déduire que

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R \frac{\mathcal{F}_t^- f}{t} dt = -2i \int_0^{+\infty} f(x) \phi(x) dx.$$

(4) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{\arctan x}{\ln(2+x^2)}.$$

(a) Montrer que $g \in C_0^0(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que si g est la transformée de Fourier d'une fonction intégrable f alors f est impair presque partout.

(c) En déduire que g n'est pas la transformée de Fourier d'une fonction intégrable.

5. Transformation de Fourier dans L^1 – Equations différentielles

Exercice 1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \chi_{]0, +\infty[}(x).$$

Calculer explicitement $\mathcal{F}^+ f$ en remarquant que cette fonction vérifie une certaine équation différentielle.

Exercice 2. Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$. Montrer que la seule fonction $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^2(\mathbb{R})$ vérifiant l'équation différentielle

$$D^2 f - f = g$$

est donnée par

$$f = \frac{1}{2} g \star e^{-|\cdot|}.$$

Exercice 3 (Equation des ondes). Déterminer l'ensemble des solutions $u \in C^2(\mathbb{R})$ vérifiant l'équation des ondes

$$D_t^2 u = c^2 D_x^2 u.$$

Exercice 4 (Equation de la chaleur). Considérons une barre mince infinie de métal de conductivité constante γ et de chaleur spécifique volumique constante C . Si U la température en x au temps t , on a l'équation

$$D_t U = \frac{\gamma}{C} D_x^2 U.$$

Le but de l'exercice est de résoudre cette équation aux dérivées partielles sous les conditions suivantes :

- (1) Les fonctions $U, D_t U, D_x U$ et $D_x^2 U$ sont continues sur $\mathbb{R} \times]0, +\infty[$ et intégrables en x sur $\mathbb{R}$ pour tout $t \in]0, +\infty[$ fixé.
- (2) On a une condition initiale $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} U(x, t) = f(x).$$

(La convergence est dans $L^1(\mathbb{R})$.)

- (3) Pour tout intervalle compact $[t_0, t_1]$ de $]0, +\infty[$, il existe une fonction $F \in L^1(\mathbb{R})$ telle que

$$|D_t U(x, t)| \leq F(x) \quad \forall t \in [t_0, t_1].$$

6. Transformation de Fourier dans L^2

Exercice 1. Si possible, déterminer la transformée de Fourier des fonctions f , g et h définies par

(1) $f : x \in \mathbb{R}_0 \mapsto \frac{1-\cos(x)}{x},$

(2) $g : x \in \mathbb{R}_0 \mapsto \operatorname{sign}(x) \frac{\sin(x)}{x},$

(3) $h : x \in \mathbb{R}_0 \mapsto \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$

Préciser à chaque fois s'il s'agit d'une transformée de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$ ou dans $L^2(\mathbb{R})$.

Exercice 2. On donne les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x + i}.$$

Déterminer la transformée de Fourier de f et de g . Préciser s'il s'agit d'une transformée de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$ ou dans $L^2(\mathbb{R})$.

Exercice 3. Si $a > 0$ établir que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(a)}{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{2} \sin(a).$$

Exercice 4. Pour tout $a \in \mathbb{R}_0$, calculer la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x) \sin(x)}{x(x^2 + a^2)} dx.$$

Exercice 5. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $b > a > 0$. Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \arctan(ax) - \arctan(bx), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) La fonction f est-elle intégrable ? De carré intégrable ?
- (b) Déterminer si possible la transformée de Fourier de Df .
- (c) En déduire si possible la transformée de Fourier de f .

Exercice 6. Si f et g sont de carré intégrable sur $\mathbb{R}^n$, montrer que

$$\mathcal{F}^+(fg) = \frac{1}{(2\pi)^n} \mathbb{F}^+ f \star \mathbb{F}^+ g \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

7. Espaces de Hilbert et suites orthonormées totales

Exercice 1. Soit E l'ensemble des polynômes complexes de degré plus petit ou égal à 2.

- (1) Si $P, Q \in E$, on définit

$$\langle P, Q \rangle = P(0)\overline{Q(0)} + P(1)\overline{Q(1)} + P(i)\overline{Q(i)}.$$

Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .

- (2) A quelles conditions sur $a, b, c \in \mathbb{C}$ l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie par

$$\langle P, Q \rangle = P(a)\overline{Q(a)} + P(b)\overline{Q(b)} + P(c)\overline{Q(c)},$$

pour tout $P, Q \in E$, est-elle un produit scalaire sur E ?

Exercice 2. Soit H un espace pré-hilbertien. On dit qu'une suite $(f_m)_{m \in \mathbb{N}}$ de H converge faiblement dans H s'il existe $f \in H$ tel que

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \langle f_m, h \rangle = \langle f, h \rangle, \quad \forall h \in H.$$

Montrer que f_m converge vers f dans H si et seulement si elle converge faiblement vers f dans H et si

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|f_m\| = \|f\|.$$

Exercice 3. Soit H un espace de Hilbert. Déterminer une expression de la projection sur la boule unité fermée de H .

Exercice 4 (Suite orthonormée totale de Legendre). Posons $P_0(x) = 1$ et $P_1(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, posons

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x).$$

Le polynôme P_n est appelé polynôme de Legendre de degré n .

- (1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, prouver que P_n est effectivement un polynôme de degré n .
 (2) Démontrer la formule de Rodrigues

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} D^n ((x^2 - 1)^n).$$

- (3) Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$ que le polynôme P_n est une solution particulière de l'équation différentielle

$$D((1-x^2)Df(x)) + n(n+1)f(x) = 0.$$

- (4) En déduire que la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthogonale dans $L^2([-1, 1])$.

- (5) Démontrer que $\left(\frac{P_n}{\|P_n\|_2} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite orthonormée totale de $L^2([-1, 1])$. (*Suggestion :* Utiliser la transformée de Fourier de $f\chi_{[-1, 1]}$.)

Exercice 5. Soit E une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$ et soit $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite orthonormée totale de $L^2(E)$ pour laquelle il existe $C > 0$ tel que $|u_m| < C$ presque partout sur E pour tout $m \in \mathbb{N}$. Démontrer que pour tout $f \in L^1(E)$, on a

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_E f(x) u_m(x) dx = 0.$$

8. Séries trigonométriques de Fourier

Exercice 1. On considère l'espace de Hilbert $L^2([0, 1])$.

- (1) Montrer que les fonctions f et g définies par $f(x) = \cos(2\pi x)$ et $g(x) = e^{4i\pi x}$ y sont orthogonales.
- (2) Développer les fonctions g_1, g_2, g_3 en série trigonométrique de Fourier dans cet espace, en exprimant la réponse finale à l'aide de fonction sinus et cosinus et en simplifiant au maximum l'expression.

$$g_1(x) = \cos(10\pi x), \quad g_2(x) = \cos^4(\pi x), \quad g_3(x) = \cos(\pi x).$$

- (3) En déduire que

$$\frac{\sqrt{2}}{16}\pi = \sum_{m=1}^{+\infty} (-1)^{m-1} \frac{2m-1}{16m^2 - 16m + 3}.$$

Exercice 2. On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \in]-\pi, 0[\\ 1 & \text{si } x \in]0, \pi[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

- (1) Déterminer le développement en série trigonométrique de Fourier de f sur $[-\pi, \pi]$.
- (2) En déduire la somme des séries

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{(2m+1)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1}$$

Exercice 3. (1) Déterminer le développement en série trigonométrique de Fourier sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ de la fonction f donnée par $f(x) = |\sin(x)|$, $x \in \mathbb{R}$.

- (2) Déterminer la somme des séries

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{4m^2 - 1} \quad \text{et} \quad \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{4m^2 - 1}.$$

Exercice 4. (1) Déterminer le développement en série trigonométrique de Fourier sur $[-1, 1]$ de la fonction f donnée par $f(x) = x - x^3$.

- (2) En déduire la somme de la série

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2}.$$

Exercice 5. (1) Déterminer le développement en série trigonométrique de Fourier sur $[-\pi, \pi]$ de la fonction f donnée par $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

- (2) En déduire la somme des séries

$$\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{(m^2 + 1)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m^2 + 1}.$$

Exercice 6 (Noyau de Poisson). Pour tout $r \in [0, 1[$, on pose

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta) + r^2}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Pour tout $m \in \mathbb{Z}$, on pose aussi $e_m(x) = e^{imx}$, $x \in \mathbb{R}$.

(1) Pour tous $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$, montrer que

$$P_r(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} r^{|m|} e_m(\theta).$$

(2) Pour tout $r \in [0, 1[$, calculer (si possible) la valeur de l'intégrale

$$\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta.$$

(3) Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période 2π . Montrer que

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} r^{|m|} \langle f, e_m \rangle e_m(\theta) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) P_r(\theta - t) dt$$

pour tous $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. En déduire que

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{1}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} r^{|m|} \langle f, e_m \rangle e_m(\theta) = f(\theta)$$

pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

Exercice 7 (Formule sommatoire de Poisson). Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $x \mapsto x^2 f(x)$ soit borné sur $\mathbb{R}$. Démontrer que

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(x+m) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (\mathcal{F}_{2\pi m}^- f) e^{2i\pi m x}$$

pour presque tout $x \in \mathbb{R}$. En déduire que, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, on a

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x+m)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)}.$$

Exercice 8 (Inégalité de Wirtinger). Soit $f \in C_1([0, 2\pi])$ une fonction à valeurs réelles telle que $f(0) = f(2\pi)$ et $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$.

(1) Montrer que

$$\int_0^{2\pi} (f(t))^2 dt \leq \int_0^{2\pi} (Df(t))^2 dt.$$

(2) Montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $f = a \cos + b \sin$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Exercice 9. Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

(1) Prouver que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \cos(\alpha x)$ pour $x \in [-\pi, \pi[$ et prolongée par 2π -périodicité est égale à

$$\frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} \left(1 + 2\alpha^2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos(nt) \right).$$

(2) En déduire que

$$\cotg(\alpha\pi) = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2\alpha}{\pi(\alpha^2 - n^2)}.$$

(3) Démontrer que la série

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right)$$

converge pour tout $x \in]-1, 1[$. Démontrer ensuite que $g \in C_1(]-1, 1[)$ et déterminer explicitement sa dérivée.

(4) En déduire que, pour tout $x \in]-1, 1[$, on a

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2} \right).$$

9. Ondelettes

Exercice 1 (Splines). Pour $n = 0$ on pose

$$V_0^{(0)} = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \forall k \in \mathbb{Z}, f \text{ est constant sur } [k, k+1[\}$$

et pour $n \in \mathbb{N}_0$ on pose

$$V_0^{(n)} = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \forall k \in \mathbb{Z}, f|_{[k, k+1[} \text{ est un polynôme de degré } \leq n \}.$$

On pose aussi

$$g = \underbrace{\chi_{[0,1]} \star \cdots \star \chi_{[0,1]}}_{n+1 \text{ facteurs}}.$$

(1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ montrer que g et les espaces $V_j^{(n)} (j \in \mathbb{Z})$ définis par

$$V_j^{(n)} = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f(2^{-j} \cdot) \in V_0^{(n)} \}$$

forment une analyse multi-résolution de $L^2(\mathbb{R})$.

(2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ déterminer le filtre m_0 .

Exercice 2 (Littlewood-Paley). Expliquer comment construire une fonction $\theta \in C_\infty(\mathbb{R})$ à support compact, à valeurs dans $[0, 1]$, paire, égale à 1 sur $[-2\pi/3, 2\pi/3]$, égale à 1 sur le complémentaire de $[-4\pi/3, 4\pi/3]$ et telle que

$$\theta^2(x) + \theta^2(2\pi - x) \quad \forall x \in [0, 2\pi].$$

Pour un tel θ on pose

$$g = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}^+ \theta,$$

on définit V_0 comme étant l'adhérence de l'enveloppe linéaire des $g(\cdot - k) (k \in \mathbb{Z})$ et, pour tout $j \in \mathbb{Z}$ on définit

$$V_j = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f(2^{-j} \cdot) \in V_0 \}.$$

Montrer que g et les espaces $V_j (j \in \mathbb{Z})$ forment une analyse multi-résolution de $L^2(\mathbb{R})$.

Exercice 3 (Shannon). Pour tout $j \in \mathbb{Z}$, on pose

$$V_j = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \text{supp}(\mathbb{F}^- f) \subset [-2^j \pi, 2^j \pi] \}.$$

On définit aussi le sinus cardinal normalisé $\sin_\pi$ par

$$\sin_\pi(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

(1) Montrer que les espaces $V_j (j \in \mathbb{Z})$ sont fermés et que les translatés entiers de $\varphi = \sin_\pi$ forment une base orthonormée de V_0 .

(2) Montrer que les espaces $V_j (j \in \mathbb{Z})$ forment une analyse multi-résolution de $L^2(\mathbb{R})$.

(3) Montrer que dans $L^2(\mathbb{R})$ on a

$$\varphi(x) = \varphi(2x) + \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \varphi(2x - 2k - 1).$$

(4) Déterminer le filtre m_0 .